


二零零二年 世卫划分地区 死因统计

非洲


阿尔及利亚、佛得角、中非共和国、刚果、
肯尼亚及利比里亚等



不包括传染病的总死亡人数：2,993（占总死亡人数 28%）

美洲


阿根廷、加拿大、智利、哥伦比亚、古巴、
墨西哥、秘鲁、美国及委内瑞拉等



不包括传染病的总死亡人数：5,086（占总死亡人数 85%）

东南亚

孟加拉、印度、印尼、马尔代夫、曼德勒、
尼泊尔、斯里兰卡及泰国等




不包括传染病的总死亡人数：8,890（占总死亡人数 61%）



铭源医疗
发展有限公司

全球癌症概览 ...

- 约有 2,000 万人罹患癌症。
- 二零零五年全球死亡人数 5,800 万人当中，癌症的死亡人数达 760 万（占总数 13%）（中国癌症死亡人数为 170 万）。
- 每年新发现癌症个案估计会由二零零零年的 1,000 万增至二零二零年的 1,500 万。
- 预测至二零二零年癌症死亡人数将达每年 1,000 万人（中国为 300 万人，占全球总数近三分之一）。



癌症资料

何谓癌症？

癌症是一类可影响身体任何部位的百多种疾病的通称，又称为恶性肿瘤和肿瘤。癌症的一个界定特徵是其快速产生异常细胞的能力，这些细胞超越其通常范围，更可侵袭体内毗邻部位并扩散到其他器官，此过程称为「转移」，是癌症致命的主因。

癌症资料

癌症是全球主要致命疾病之一。二零零五年全球死亡人数 5,800 万人当中，癌症的死亡人数达 760 万（占总数 13%）。癌症总死亡率其中份额最大的主要癌症种类包括：

- 肺癌（130 万死亡人数/ 年）；
- 胃癌（约 100 万死亡人数/ 年）；
- 肝癌（662,000 死亡人数/ 年）；
- 结肠癌（655,000 死亡人数/ 年）；及
- 乳癌（502,000 死亡率人数/ 年）。

二零零五年全部癌症致命个案当中，超过 70% 发生于中低收入国家。预计全球癌症死亡人数将持续增加，至二零一五年将达 900 万人，到二零三零年更增至 1,140 万人。

全球最常见的癌症种类包括：


- 男性（按全球死亡人数排序）：肺癌、胃癌、肝癌、结肠及直肠癌、食道癌和前列腺癌。
- 女性（按全球死亡人数排序）：乳癌、肺癌、胃癌、结肠及直肠癌和子宫颈癌。

资料来源：

- 世卫，二零零六年
- <http://www.healthalliance.com/cancer/cancer.html>


资料来源：

- 世卫资料单张，二零零六年二月
- 世卫「第 58 届世界卫生组织大会临时议程」第 13.12 项
- 世卫癌症资料单张，二零零三年



欧洲


阿尔巴尼亚、亚美尼亚、奥地利、比利时、
保加利亚、捷克共和国、丹麦、德国及
匈牙利等



不包括传染病的总死亡人数：9,002（占总死亡人数 94%）

地中海东部


阿富汗、巴林、埃及、伊朗、伊拉克、科威特、
摩洛哥、巴基斯坦、沙特阿拉伯及
苏丹等



不包括传染病的总死亡人数：2,422（占总死亡人数 58%）

西太平洋

澳洲、柬埔寨、中国、马来西亚、蒙古、新
西兰、韩国及越南等



不包括传染病的总死亡人数：10,242（占总死亡人数 86%）

癌症资料便览

- 40% 的癌症可以预防（方法包括健康饮食、恒常运动和戒用烟草）。
- 吸烟是全球最大的可预防的癌症成因。吸烟可引致肺癌、喉癌、口腔癌、胰癌、膀胱癌、胃癌、肝癌、肾癌和其他癌症；周遭环境的烟草烟雾（二手烟）也可引致肺癌。
- 全球五分之一的癌症源于慢性感染，主要来自乙肝病毒（导致肝癌）、人类乳头状瘤病毒（导致子宫颈癌）、幽门螺杆菌（导致胃癌）、血吸虫（导致膀胱癌）、肝吸虫（胆管癌）以及人类免疫缺乏病毒（卡波西肉瘤及淋巴瘤）。

癌症的成因

癌症是由于负责细胞生长和修复的基因产生变化而诱发。这些变化是由于基因宿主与外部物质之间相互作用而产生。有关的外部物质可分类为：

- 物理致癌物质，例如紫外线和电离辐射；
- 化学致癌物质，例如石棉和烟草烟雾；
- 生物致癌物质，例如—
 - 由病毒（乙肝病毒引致肝癌、人类乳头状瘤病毒引致子宫颈癌）和细菌（幽门螺杆菌引致胃癌）以及寄生虫（血吸虫病引致膀胱癌）引起的感染；
 - 由真菌毒素造成的食品污染，例如造成肝癌的黄麴毒素（黄麴属真菌的产物）。