

詞彙

本技術詞彙載有本文件所用若干詞彙之說明，該等詞彙與本公司有關，並就本公司業務或本公司而於本文件使用。該等詞彙與其涵義未必與業內標準定義相符。

「苜蓿草」	指	廣泛使用作為農畜飼料而種植的植物；
「平均每年產奶量」	指	年度產奶量除以成母牛的年度總擠奶天數，再乘以每頭成母牛每個泌乳期的平均擠奶天數；
「牛副結核病」	指	由鳥分枝桿菌亞種副結核引起的反芻動物的慢性腸炎，亦稱為約尼氏症，通常在牛、綿羊、山羊、駱駝科及水牛等家養及野生反芻動物身上發現；
「牛結核」	指	牛結核病為一種慢性高傳染性疾病，主要影響牛畜，但可傳染人類，其由牛分枝桿菌引起，牛分枝桿菌為一組一般會影響呼吸系統的細菌；
「布魯氏桿菌病」	指	牛畜的布魯氏桿菌病為一種高傳染性疾病，於生育或流產時透過受感染物質傳播，並可導致不育、不健全及產奶量減少；
「公牛」	指	雄性牛科動物；
「犏牛」	指	由出生起計至六月齡的年輕雌性牛；
「牛」	指	一類牛科動物，包括公牛、犏牛、育成牛及成母牛；
「精飼料」	指	由多種穀物(包括玉米、豆粕及棉粕)混合製成的奶牛飼料；
「奶牛」	指	犏牛、育成牛及成母牛；
「乾奶牛」	指	處於泌奶週期中的乾奶期的成母牛，成母牛在這期間不會生產任何生鮮乳；
「口蹄疫」	指	口蹄疫，一種高傳染性並可透過接觸傳染的牲畜疾病，可影響牛、豬、綿羊、山羊、鹿、麋及其他偶蹄類動物，可導致生產力大減，如產奶量減少或跛行，甚至令幼畜死亡；

詞彙

「粗飼料」	指	供放牧牲畜食用的植物；
「克」	指	克；
「GMP」	指	由美國食品及藥品管理局強制執行的良好製造規範規例；
「HACCP」	指	危害分析與關鍵控制點體系(Hazard Analysis And Critical Control Points)，一套透過對原材料生產、採購及處理，以至製成品之製造、經銷及消耗進行生物、化學及物理危害分析及控制以處理食物安全之管理系統；
「育成牛」	指	逾六個月大未曾產犢牛的雌性牛科動物或公牛；
「荷斯坦種奶牛」	指	一種產奶量高的奶牛；
「畜牧」	指	透過使用科學化原則管理以及養殖、繁殖及飼養牲畜，特別是動物繁殖；
「千克」	指	千克；
「千焦耳」	指	千焦耳；
「液態奶」	指	飲用奶，包括純牛奶、風味牛奶及發酵乳；
「乳腺炎」	指	乳腺發炎，於受感染時可令產奶量大減，且在若干情況下可降低繁殖能力及令牛隻的發情期延遲開始；
「微生物數目」	指	生鮮乳中的微生物數目，為一項重要的生鮮乳安全指標；
「成母牛」	指	曾產犢的雌性牛科動物，為乾奶牛或成母牛；
「毫升」	指	毫升；
「畝」	指	在中國使用的面積單位，相等於約667平方米；

詞彙

「青貯飼料」	指	通過將青飼料作物儲藏在青貯窖內而製成的多汁而潮濕的飼料；最常用的青貯作物是玉米；其他作物包括高粱、向日葵、豆類和青草；青貯玉米為經發酵的玉米，用於飼餵家畜或製造生物燃料；
「平方米」	指	平方米；
「SSOP」	指	清潔乳品加工設備的衛生標準操作程序；
「噸」	指	公噸，即1,000千克；
「乳清」	指	奶酪的一種液態副產品，蛋白質含量高；
「犛」	指	大多出現在青藏高原的一種長毛牛科動物；及
「%」	指	百分比。