

## 技術詞彙

於本文件，除文義另有列明者外，否則下列詞彙應具有以下涵義。

「AI」或「人工授精」	指	人工授精，將精子輸送至女性生殖系統，透過非性行為令女性受孕的體內受精過程
「AID」	指	以供體精子人工授精
「AIH」	指	以丈夫精子人工授精
「男科」	指	有關男士特定疾病及狀況的醫學分支
「ARS」	指	輔助生殖服務
「ART」	指	輔助生殖技術
「ART取卵週期數」	指	一個女人從開始服用生育藥物或監測到她的卵巢有卵泡生成時開始的週期，以及如果生成卵子，進展到卵子取出的取卵週期
「輔助孵化」	指	IVF中所使用的在胚胎透明帶上開孔或削薄透明帶的厚度，使其更順利孵出囊胚從透明帶中順利孵出的醫學過程
「副主任醫師」	指	於中國的副主任醫生；副主任醫師可監督主治及住院醫師，指導特定範疇的研究工作及通常處理複雜的醫療個案
「弱精症」	指	病徵為精子活力降低的男性生育狀況
「主治醫師」	指	於中國的主治醫生；主治醫師可監督住院醫師以及通常進行醫療治療、教學、研究及疾病預防工作
「胚泡」	指	處於某一階段的胚胎一種形式，由桑葚胚發展而來，內部出現含有液體的空腔
「主任醫生」	指	於中國的主任醫生；主任醫師一般負責管理一個特定臨床部門
「育齡夫婦」	指	女士年齡介乎15至49歲的夫婦

## 技術詞彙

「二級醫院」	指	國家衛生計生委醫院分類系統將區域醫院認定為二級醫院，這類醫院通常擁有 100 張至 500 張運營床位，為多個社區提供綜合醫療服務，並承擔一定的學術和科研任務
「三級醫院」	指	國家衛生計生委醫院分類系統將中國的最大和水準最高的區域醫院認定為三級醫院，這類醫院通常擁有超過 500 張運營床位，為大範圍地區提供優質專業的醫療服務，並承擔較高層次的學術和科研任務
「三級醫院(婦產或婦幼保健服務中心)」	指	中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會指定的中國最高標準的最大的地區婦產或婦幼保健服務中心
「臨床妊娠」	指	妊娠的定義為經超聲波顯示子宮內有胚囊(在美國)及經超聲波發現胎兒心跳(在中國)
「臨床妊娠率」	指	按臨床懷孕結果總數除以新鮮及冷凍胚胎移植總數計算
「冷凍保存」	指	將體外培養物懸浮在加有冷凍保護劑的溶液中，以一定的冷凍速率降至零下某一溫度，並在此溫度下對其長期保存的過程
「取卵」	指	收集含有卵巢卵泡的卵子的外科手術
「胚胎」	指	直至第 8 週的受精卵
「胚胎移植」	指	IVF 中將胚胎移植入女性子宮的過程
「胚胎學」	指	有關配子產前發育、受精，以及胚胎及胎兒發展的生物學分支
「內分泌科」	指	涉及內分泌腺結構、功能及紊亂的醫學分支
「子宮內膜異位症」	指	有活性的內膜細胞種植在子宮內膜以外的位置而形成的一種女性常見婦科疾病

## 技術詞彙

「卵泡」	指	卵巢中卵母細胞發育的基本功能單位，呈圓形泡狀，位於卵巢皮質
「婦科」	指	有關女士特定疾病及狀況的醫學分支
「HIV」	指	人類免疫缺陷病毒
「ICSI」	指	卵胞漿內單精子注射，通過顯微注射將單精子注射入卵胞漿的IVF取卵技術，以致精子與卵母細胞被動結合並受精形成受精卵達到受孕
「不孕夫婦」	指	經過12個月或更長時間經常性進行未有避孕的性交後仍未能懷孕的夫婦，通常由於其中一位或兩位有生育問題
「不孕症」	指	病徵為12個月或以上定期無避孕下性交而未能懷孕的疾病
「準父母」	指	有意通過輔助生殖服務成為父母的人士或夫婦
「IVF」	指	體外受精，將卵子與精子在體外受精，發育成胚胎，以達到受孕目的的過程
「IVF-ET」	指	體外受精及胚胎移植，將卵子與精子在體外，發育成胚胎後，再移植回母體子宮內，以達到受孕目的
「IVF患者」	指	開始進行IVF取卵週期的患者
「IVF取卵週期數」	指	取回含有卵巢卵泡的卵子開始的週期，此後取卵週期一般發展至卵子與精子結合以產生胚胎
「活產率」	指	按導致活產新生兒的分娩數量除以胚胎移植數量計算
「少精症」	指	病徵為精子數量少的男性生育狀況
「卵母細胞」	指	在卵子發生過程中進行減數分裂的卵原細胞

## 技術詞彙

---

「卵巢」	指	作為女性生殖系統一部分的器官
「排卵」	指	從卵泡中排出一個成熟的卵子
「滲透率」	指	按接受輔助生殖服務的夫婦數量除以需要輔助生殖服務的不孕夫婦的數量計算
「PGD」	指	植入前遺傳學診斷，用於當父母單方或雙方發生基因突變或染色體平衡重排的情況時，進行測試以確定具體的突變或染色體失衡是否已傳入卵子或胚胎中的技術
「PGS」	指	植入前遺傳篩查，用於檢測胚胎的染色體數量是否異常(非整倍體)及檢查哪些胚胎的染色體正常適合轉移的技術
「不孕症患病率」	指	按不孕夫婦數目除以生殖年紀夫婦數目計算(就女性而言指15至49歲)
「黃體素」	指	垂體前葉所分泌的激素，刺激卵巢激素分泌，參與卵泡成熟與排卵，使破裂卵泡形成黃體，並分泌雌激素
「自然流產」	指	非人為因素導致的流產
「成功率」	指	就本文件的討論採用「臨床妊娠率」形式